

Strana 1

Prosím na čiernom pozadí , koláž produktu, čierno bielej kravy a presýpacích hodín v ktorých bude namiesto piesku mlieko

Prosím nekopírovať poslaný obrázok kravy, je len pre inšpiráciu!

CLAMOX LC

intramamálna suspenzia pre dojnice v období laktácie

(Amoxycilín, Kyselina klavulánová, Prednisolon)

Záleží na každej kvapke





SPC produktu:QR kód

Logo Crida, Cymedica

2.Strana

prosím text do „blokov“ vždy k nadpisu v bolde patří blok

CLAMOX LC

intramamálna suspenzia pre dojnice v období laktácie

24x 1 aplikačná striekačka

Vysoká účinnosť pri zodpovednom používaní antibiotík

Každá striekačka (3g) obsahuje:

Amoxycillinum (ut Amoxicillinum trihydricum)	200 mg
Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas)	50 mg
Prednisolonum	10 mg

Liečba klinických mastitíd u laktujúcich kráv spôsobených nasledovnými patogénmi:

Stafylokoky (vrátane kmeňov produkujúcich β -laktamázu).

Streptokoky (vrátane *S. agalactiae*, *S. dysgalactiae* a *S. uberis*).

Escherichia coli (vrátane kmeňov produkujúcich β -laktamázu).

Jednoduchá aplikácia, aplikačný hrot s dvomi rôznymi priermi pre rôzne typy ceckových kanálov

Obsah jednej striekačky aplikovať do každej postihnutej štvrtky ceckovým kanálkom ihneď po vydojení, 3-krát v 12-hodinových intervaloch.

V prípade infekcií spôsobených *Staphylococcus aureus* môže byť potrebný dlhší čas antibakteriálnej liečby. Preto by mala byť celková dĺžka liečby posúdená veterinárnym lekárom a zároveň by mala byť dostatočne dlhá na zabezpečenie kompletného odstránenia intramamálnej infekcie.

Krátke ochranné doby

Mlieko: 84 hodín. U kráv dojených dvakrát denne mlieko sa môže použiť na ľudskú spotrebu od siedmeho dojenia, t. j. 84 hodín po skončení liečby.

Mäso a vnútornosti: 7 dní

Upozornenie

Nepoužívať v prípade mastitíd spôsobených *Pseudomonas* spp.

Kontakty Cymedica SK

Logo Cymedica