

1. strana

prosím koláž kravy, prasatá, psy mačky + foto výrobku

CLAMOX RTU

injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok, ošípané, psy a mačky

(Amoxycilín, Kyselina klavulánová)

Jednoducho komplexný

SPC prípravku: QR kód

Logo: CRIDA, Cymedica

2. strana

prosím text do „blokov“ vždy k nadpisu v bolde patrí blok

CLAMOX RTU

injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok, ošípané, psy a mačky

1x 100 ml

Osvedčené účinné zloženie

1 ml obsahuje:

Účinné látky:

Amoxycillinum (ut Amoxicillinum trihydricum)	140 mg
--	--------

Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas)	35 mg
---	-------

Jednoducho komplexný účinok

Tento liek má baktericídne účinky proti širokému spektru klinicky významných baktérií identifikovaných u veľkých a malých zvierat. In vitro je liek účinný proti širokému spektru baktérií, vrátane kmeňov rezistentných voči samotnému amoxicilínu v dôsledku produkcie beta-laktamázy:

Hovädzí dobytok:

Infekcie dýchacích ciest, mäkkých tkanív (napr. ochorenie klbov/pupka, abscesy atď.), metritída a mastitída.

Ošípané:

Respiračné bakteriálne infekcie u rastúcich ošípaných; kolibacilóza, popôrodné infekcie u prasníc (napr. mastitis, metritis,agalactiae).

Psy a mačky:

Infekcie dýchacích ciest, močových ciest, kože a mäkkých tkanív (napr. abscesy, pyodermia, zápaly análnych žliaz, gingivitída).

Jednoduché podanie a dávkovanie

Spôsob podania:

Psy a mačky: intramuskulárne alebo subkutánne,


Hovädzí dobytok a ošípané: len intramuskulárne.

1 ml lieku/20 kg ž.hm. denne, po dobu 3 - 5 po sebe nasledujúcich dní. Pred použitím liekovku dobre pretrepať. Po aplikácii miesto vpichu masírovať. Použiť sterilnú suchú ihlu a injekčnú striekačku. Pred použitím zátku vždy dezinfikovať.

Kombinovaná liečba pri liečbe bovinnej mastitídy

V prípadoch, keď je nevyhnutná systémová aj intramamálna liečba, je možné použiť Clamox RTU injekčnú suspenziu v kombinácii s Clamox LC intramamálna suspenzia.

Pri kombinovanej liečbe sa odporúča dodržiavať nasledujúci minimálny liečebný režim:



Krátke ochranné doby

Hovädzí dobytok:

Mäso a vnútornosti: 42 dní

Mlieko: 60 hodín

V prípade kombinovanej liečby môže byť mlieko spotrebované do 60 hodín po poslednom ošetroaní (po 5 dojeniach, ak sú kravy dojené dvakrát denne).

Ošípané:

Mäso a vnútornosti: 31 dní

Upozornenie

Kyselina klavulánová je citlivá na vlhkosť. Je preto veľmi dôležité, aby sa pri odoberaní suspenzie z liekovky použila suchá ihla a striekačka, aby sa zabránilo kontaminácii zvyšného obsahu liekovky kvapkami vody. Kontaminácia môže mať za následok výskyt tmavohnedých guľôčok, ktoré súvisia so zanesením kvapiek vody do liekovky. Takto zmenená látka by sa nemala byť používať, pretože môže mať významne znížený účinok.

Kontakty Cymedica SK

Logo Cymedica