

HYALURONAN BIOVETA 10 MG/ML INJEKČNÝ ROZTOK

Injekčný roztok s obsahom kyseliny hyalurónovej

TYP PRÍPRAVKU: Výživa kĺbov

CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT: Pes, Mačka, Kôň

Číra bezfarebná kvapalina.

Cieľový druh

Kone, psi, mačky.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Ortopedické:

- Akútne a chronické artrózy, polyartrózy
- Subakútne a chronické artritídy
- Akútne a chronické tendovaginitídy, tendinózy a burzitídy
- Osteochondrózy

Oftalmologické:

- Akútne a chronické keratitídy
- Konjunktivitídy, keratokonjunktivitídy
- Keratokonjunktivitis sicca
- Ulcus corneae
- Poranenie rohovky

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Nepodávať súčasne s kationickými antimikrobiálnymi látkami (erytromycínom, amoxicilínom, cefchinomom), ktorými sa zráža.

Ostatné skupiny liečiv: kortikoidy, nesteroidné protizápalové lieky, vitamíny, minerály a očné prípravky sú s hyaluronanom plne kompatibilné.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Spôsob aplikácie:

1) Intravenózna (subkutánná) aplikácia

a) Kone:

Dávka: obvykle 6 ml (60 mg).

Počet dávok: 3-7 dávok, optimum 5.

Interval medzi dávkami: 3-9 dní, optimum 7.

b) Psi, mačky:

Dávka: mierne nižšia, obvykle 3-5 ml.

Počet dávok: 3-7 dávok, optimum 5.

Interval medzi dávkami: 3-9 dní, optimum 7.

2) Topicky do spojivkového vaku:

Dávka/počet dávok: 1-2 kvapky do oka (spojivkového vaku) každé 2-12 hod.

Čas podávania: 5-60 dní, príp. permanentne (akútny zápal 5-7 dní, chronický zápal do zlepšenia/vyliečenia).

Hyaluronan, ako účinná látka telu vlastná, sa syntetizuje v cieľových tkanivách a odbúrava sa najmä v pečeni. Metabolizmus hyaluronanu je rýchly (polčas v krvi je niekoľko minút). Koncentrácia hyaluronanu v krvi sa zvyšuje pri niektorých chorobách, pri ktorých je znížená jeho degradácia (napr. cirhóza) alebo zvýšená jeho produkcia (napr. zápal).

I prípadne extrémne vysoká dávka (prevyšujúca rádovo bežne aplikovanú dávku) sa v tele bez následkov rýchle odbúra.

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky.

Po prvom otvorení vnútorného obalu musí byť liek ihneď spotrebovaný.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom. Chrániť pred mrazom.

Balenie:

- 5 x 6 ml