

INTRAMAR SEAL 2,6 g intramamárna suspenzia

LIEKOVÁ FORMA Intramamárna biela suspenzia.

ZLOŽENIE Jeden aplikátor (4 g) obsahuje:

- Bismuthi subnitrates: 2,6 g

INDIKÁCIE Prevencia nových intramamárnych infekcií počas obdobia stania nasucho. Dochádza k redukcii výskytu subklinických mastitíd u kráv po otelení a klinických mastitíd v období stania nasucho a nasledujúcej laktácie (po dobu najmenej 60 dní po otelení). Použitie prípravku INTRAMAR SEAL sa odporúča ako súčasť opatrení v stáde na prevenciu mastitíd. U kráv, kde sa nepredpokladá výskyt subklinických mastitíd, sa môže INTRAMAR SEAL aplikovať samostatne pri zaprahnutí. U ostatných zvierat je potrebné postupovať podľa používaných preventívnych opatrení alebo podľa rady veterinára. V praxi sa môžu zvoliť kritériá na výber dojníc na základe výskytu mastitíd a počtu somatických buniek u jednotlivých kráv, alebo na základe testu na detekciu subklinických mastitíd alebo bakteriologického vyšetrenia. V prípade individuálneho zistenia počtu somatických buniek použite INTRAMAR SEAL u kráv, ktoré majú menej ako 200 000 buniek/ml pred zaprahnutím. Mierne zvýšenie počtu buniek zistené v posledných 4 týždňoch pred zaprahnutím je normálne a nemusí byť brané do úvahy. U kráv, ktoré môžu mať subklinickú mastitídu, sa môže INTRAMAR SEAL použiť po podaní vhodnej antibiotickej liečby do infikovanej štvrti.

CIEĽOVÉ DRUHY ZVIERAT Hovädzí dobytok – dojnice v období zaprahnutosti.

PODÁVANÉ MNOŽSTVO A SPÔSOB PODANIA Intramamárne podanie. Aplikujte obsah jedného aplikátora INTRAMAR SEAL do každej štvrti mliečnej žľazy po poslednom dojení v laktácii (pri zaprahnutí). Po aplikácii prípravku neprevádzajte masáž struku alebo vemena. Pre zníženie rizika vzniku mastitídy po aplikácii prípravku postupovať opatrne, aby sa zabránilo preniknutiu patogénov do vemena. INTRAMAR SEAL nemá antimikrobiálnu účinnosť, preto je nevyhnutné, aby bol struk pred aplikáciou dôkladne mechanicky očistený a dezinfikovaný chirurgickým liehom, dezinfekčným obrúskom alebo inou vhodnou technikou. Struky by sa mali čistiť, kým obrúsky nie sú viditeľne špinavé. Struky nechajte pred aplikáciou vyschnúť. Aplikujte asepticky a vyvarujte sa nožnej kontaminácii hrotu aplikátora. Po aplikácii sa odporúča ponorenie strukov do príslušného roztoku alebo jeho ošetrenie sprejom.

SKLADOVANIE Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chráňte pred mrazom.

OCHRANNÁ LEHOTA Bez ochranných lehôt.

DOBA POUŽITELNOSTI Doba použiteľnosti veterinárneho liečivého prípravku v neporušenom obale: 2 roky.

BALENIE 24 x 4 g, 160 x 4 g a dezinfekčné obrúsky navlhčené 65 % roztokom izopropylalkoholu (2,4 ml/obrúsok) na očistenie struku.