



Delta®

Acariflash®

Tekuté doplňkové krmivo pro nosnice

Cíle podávání

- Snížení stresových reakcí drůbeže spojených s výskytem Čmelíka kuřího.

Složení

- Glycerin, lopuch, sodná sůl kyseliny benzoové, chlorid hořečnatý, sorbitol.

Analytické složky

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| • Hrubý tuk.....<0.1 % | • Hrubý protein.....<0.1% | • Sodík.....0.1 % |
| • Hrubý popel.....0.2 % | • Hrubá vláknina.....<0.1% | • Lysin.....<0.1 % |
| | | • Methionin.....<0.1 % |

Doplňkové látky v 1 L

- | | | |
|--|--|---|
| • Antioxidanty
E310 Propylgalát.....200 mg
E320 Butylovaný hydroxyanisol.....100 mg | • Senzorické doplňkové látky
Směs z aromatických látek | • Konzervanty
1a295 kyselina mravenčí(mravenčan amonný) 2560 mg
1k202 Kyselina sorbová(sorbát draselný) 2217 mg
1a330 Kyselina citronová 100 mg |
|--|--|---|

Návod k použití

- Přidejte ACARIFLASH do pitné vody v dávce 0,75 litru na 1000 litrů vody nepřetržitě po dobu 4 dní. Po asi týdenní přestávce tuto kúru zopakujte.
 - Dále podávejte 1 až 2 **nenásledující** dny v týdnu v dávce 0,75 litru na 1000 litrů vody. Doporučujeme takto podávat nepřetržitě až do konce snášky.
 - V případě nutnosti, zopakovat základní čtyřdenní dávku (0,75 ml/litr vody po 4 dní nepřetržitě) a dále pokračovat 1 až 2 následující dny týdně ve stejném ředění.
 - Pokud je to možné, doporučuje se aplikace pro kuřice 2 týdny před naskladněním do snáškových hal a pokračujte následující 2 týdny po transferu. Poté pokračujte 1 den v každém týdnu v množství 0,75 l/l vody až do konce snášky.
 - Doporučené období používání: v období silného stresu, zejména v době přemnožení čmelíka kuřího.
- Případně:**
- Uskutečňte druhou aplikaci ostatních kontaktních produktů (ACARITEC) na příslušnou technologii 4 týdny po první aplikaci v případě, vyžaduje-li to daná situace.

Doporučení

- Při použití produktu a k zajištění správné účinnosti, se doporučuje použít dávkovací pumpu.
- Před použitím protřepat.
- Poradte se se svým veterinářem či technikem.
- Může být pozorována redukce příjmu vody v rozmezí 7 až 10 % bez negativních dopadů na produkci. Při poklesu příjmu vody nad 10 % snižte dávku.

Doba použití

- 24 měsíců v originálním balení uschovaném na suchém a chladném místě bez světla a nadměrného tepla.

Vyrobeno s certifikací
OQUALIM-STNO.
Vhodné i pro
produkci se známkou
„krmeno bez použití
GMO < 0,9“

IFRAMIX 
CCPA GROUP

IFRAMIX s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9;
tel: +420 739 777 444: iframix@iframix.cz;
www.iframix.cz

5l kanystř

© Copyright, Janzé, Groupe CCPA