

Dophatyl-ject 200 000 IU/ml

injekčný roztok pre hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané

Účinná látka: Tylosinum 200 000 IU v 1 ml prípravku

Indikácie: Hovädzí dobytok (dospelý): Liečba infekčných ochorení respiračného traktu, metritídy vyvolané grampozitívnymi mikroorganizmami, mastitídy vyvolané *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., interdigitálna nekrobacilóza tj. panaríciom, infekčné pododermatitídy. Teľatá: Liečba infekčných ochorení respiračného traktu a nekrobacilózy. Ovce a kozy: Liečba respiračných ochorení, metritídy vyvolané grampozitívnymi mikroorganizmami a mastitídy vyvolané grampozitívnymi mikroorganizmami a *Mycoplasma* spp. Ošípané: Liečba enzootickej pneumónie, hemoragickej enteritídy, erysipelu a metritídy. Liečba artritídy vyvolanej *Mycoplasma* spp. a *Staphylococcus* spp.

Dávkovanie a podávanie: Ovce, kozy a ošípané: intramuskulárne podanie. Hovädzí dobytok: intramuskulárne a intravenózne podanie. Hovädzí dobytok: 2,5 – 5 ml lieku/100 kg živej hmotnosti jedenkrát denne po dobu 3 dní. Intravenózne podanie by malo byť podávané pomaly. Ovce, kozy: 5 ml lieku/100 kg živej hmotnosti jedenkrát denne po dobu 3 dní. Ošípané: 2,5 – 5 ml/100 kg živej hmotnosti jedenkrát denne po dobu 3 dní.

Ochranné lehoty: Hovädzí dobytok: Mäso: 28 dní. Mlieko: 108 hodín. Ovce, kozy: Mäso: 42 dní. Mlieko: 108 hodín. Ošípané: Mäso: 16 dní.

